

· 安全用药 ·

炎痛喜康引起上消化道大出血 1 例

南昌市第三医院内科(南昌市, 330048) 蒋景哗

患者×××男、70岁、皖籍、退休工人。于1983年8月22日因呕吐咖啡样液三次入院。缘因四肢关节痠痛求治于本厂医务室,接受炎痛喜康(Piroxicami河南省开封制药厂)20毫克每日一次,共服一周。服药次日即感到心窝都疼痛加剧,始解黑便,每日一次约300—500克,直至入院当天出现呕吐咖啡样内容物共三次计300毫升、自感眩晕、眼花、心悸、乏力而住院。既往无胃病史,从无呕血及黑便史。查体: T36.6℃ BP110/60毫米汞柱、神志清楚、贫血外貌、心肺无异常。全腹无压痛、肝脾未触及。化验: RBC 112万/mm³ Hb 3 g/dl W·B·C 5100 N 54% < 46% 血型(O)型。粪匿血试验: 阳性

(州)。尿常规化验: 正常。肝功正常。诊断: 上消化道出血、重度贫血。住院治疗经过: 立即止血、制酸剂、控制饮食、输血(先后共输入同型全血2000毫升)、病情逐渐好转。9月7日行X线钡餐检查示: 胃、十二指肠未见器质性病变。共计住院22日痊愈出院。

炎痛喜康为新的非甾体消炎镇痛药,其特点为服药量小而维持时间长,据云治疗类风湿及风湿性关节炎总有效率均在80%以上。其副作用为对胃肠道有刺激、且可引起胃肠道出血或溃疡。个别患者还可产生浮肿。本例患者则因内服炎痛喜康而致上消化道大出血、应引为警惕。故建议临床医生慎重选择适应症,有胃病史者慎用或忌用。