

优降糖致低血糖失语 1 例

吕志美 王素青 (浙江省丽水地区医院, 丽水 323000)

患者, 男, 50 a, 因失语 2 h 入院, 有糖尿病史 8 a, 曾间断用过胰岛素, D860 等药。入院前服用优降糖 2 wk, 3 次/d, 2.5 mg/次, 入院当天晨 6 时(空腹)家属发现患者在床上呻吟, 神志清楚, 肢体活动正常, 但不能言语。2 h 后言语恢复, 头晕, 视物不清; 下午来本院门诊查血糖(餐后)8.1 mmol/L, 脑电图轻一中度异常; 血、尿常规; 尿糖、肝、肾功能、心电图、胸片、头颅片均正常, 初步考虑失语系脑血管疾患; 入院后仍给优降

糖 2.5 mg/次, 3 次/d, d2 晨 5 时许查空腹血糖 2.6 mmol/L, 诉头昏、视物不清, 即考虑为优降糖所致低血糖失语。停用优降糖, d3、d4 晨空腹血糖各为 4.9、5.1 mmol/L, 症状消失, 观察半个月无异常出院。

体会: 本文提示使用优降糖时, 临床上应提高警惕, 防止低血糖发生, 加强对偶发症状的认识, 注意与脑部疾病相鉴别, 以便正确处理。

收稿日期: 1992—11—28