

· 安全用药 ·

安乃近致小儿肉眼血尿 1 例

裴淑丽 (河北省丰南县医院, 丰南 063300)

患者, 男, 2 a。体重14 kg。因发热在家口服安乃近片(0.5 g), 1片/次, 3次/d, 连服2 d。d 3 上午出现肉眼血尿, 呈洗肉水样, 无尿频、尿急、尿痛、少尿等症状。否认使用其它肾毒性药物。既往无泌尿系疾患和出血性疾病史, 无外伤史。体检: T 36°C, BP 12/8 kPa, 精神好, 眼睑及双下肢无水肿, 咽部轻度充血, 双侧扁桃腺 I 度肿大, 无脓性分泌物。心肺无异常。腹平坦, 软, 无压痛, 腹部移动性浊音(-), 双肾区无叩痛。尿常规: 沉渣镜检红细胞满视野, 蛋白(+), 潜血(卅)。入院后停服安乃近, 卧床休息, 给予青霉素、三磷酸腺苷、辅酶A、肌苷等药物治疗, d 2 尿色呈淡黄, d 3 尿常规镜检红细胞每高倍视野 3—5 个, 蛋白(+), 潜血(卅)。d 5 尿常规恢复正常。尿液 3 次培养均阴性。血象: 血红蛋白 118 g/L, 白细胞 11.7 × 10⁹/L, 中性粒细胞 0.44, 淋巴细胞 0.56。血沉、肾功能、总补体、补体 C₃、抗链“O”均正常, 多次

复查尿常规正常。

体会 患儿在服药后不久即出现肉眼血尿, 而无其它临床症状和体征。肾功能检查正常。既往无肾脏疾患和出血性疾病史。停药后给予一般治疗, 血尿迅速消失, 预后良好。根据以上特点, 可以认为血尿的发生与安乃近有关。

安乃近为氨基比林与硫酸钠的化合物, 与氨基比林相同, 有解热、镇痛、抗风湿等作用。用于高热头痛、伤风、感冒、肌肉痛、牙痛、关节痛、月经痛及风湿性关节炎等。副作用及毒性有引起粒细胞减少的可能。特异体质者可能发生过敏性紫癜、皮疹、剥脱性皮炎、甚至出现过敏性休克。本病例口服安乃近引起肉眼血尿, 可能与以下因素有关:

1. 用量过大, 饮水量少, 致短时间内药物在肾脏积蓄, 直接损害肾实质。
2. 患儿对该药呈高敏状态。