

菌必治静脉注射致过敏反应 1 例

夏爱军 (中国人民解放军三〇三医院, 南宁 530021)

患者, 女, 38 a。因车祸致双下肢粉碎性骨折, 手术后d1, 静滴先锋霉素V进行抗感染治疗, 患者诉有上腹部不适, 恶心, 干呕, 无皮疹及其它不适, 停药后症状逐渐消失。遂改用菌必治静脉注射。当菌必治1g溶于10 ml注射用水给患者缓慢静注约4 ml后, 出现头昏、恶心、面色苍白, 上腹绞痛, 全身肌张力增强, 血压15/12 kPa, 脉搏90次/min, 呼吸23次/min。立即停用菌必治, 采取低流量给氧, 5%葡萄糖500 ml静滴, 地塞米松10 mg莫非氏管滴入, 肌注安定10 mg, 30 min后

上述症状缓解。

体会 菌必治(Rocephin)即头孢三嗪噻肟(Ceftriaxone)属长效第三代头孢菌素, 是临床较常用的广谱抗菌素。菌必治毒性低微, 无致畸和致突变作用, 但仍偶见过敏反应发生, 该药过敏反应的确切机理尚不清楚, 由于其在体内不被代谢, 且对血清蛋白结合率为95%, 故过敏反应的发生, 可能是该药本身具有半抗原性, 与血清蛋白结合后, 使高敏的个体引起临床所见到的各种变态反应所致。

收稿日期: 1993-08-25