

复方新诺明引起严重反应 1 例

佟晓光 (河北省唐山市骨科医院, 唐山 063000)

翟×, 女, 10 a。93年8月8日晨, 因怀疑上呼吸道感染服用一片复方新诺明。服药后半小时恶心、呕吐、周身不适、咽痛明显。到12时眼睛发红, 舌及口腔发红, 继而颜面发红、胸部发红。接着脸部发现红疹、至夜间全身都出现红疹, 只有双下肢分布较稀。大、小便时疼痛。下午六时许发烧达39°C、40°C。因医院无床位, 未能住院。至九日下午四时, 红疹上起水泡, 迅速弥漫全身, 眼角膜充血、出血、眼球罩一层白膜状物, 眼睑水肿, 出现昏迷症状, 连续出现高烧, 最高达40°C, 九日晚住院治疗, 检查血压正常, 心率90/min。因未确诊, 以静滴先锋霉素6号抗感染治疗。因水泡有破溃、

局部感染。至十一日, 确诊为药物过敏, 按抗过敏治疗, 发病第五日退烧, 又过两日, 可少量进餐。抗过敏治疗半个月, 期间口吐凉粉状(脓状)粘液, 持续一周。为防溃破面感染、加抗菌素静滴。八月廿二日始, 全身开始蜕皮。1 wk后, 除口腔、阴部稍有溃烂面、感觉疼痛以外, 全身水泡起皮脱落。没有异常感觉, 发病1 mo后, 痊愈出院。

据查, 患者直系亲属无一有药物过敏史, 也无过敏体质发现。因该患者发病前只服用过一片复方新诺明, 经抗过敏治疗好转并痊愈, 所以, 怀疑为复方新诺明引起的严重过敏反应, 大疱表皮松懈症。

收稿日期: 1993-12-28