

非普拉宗片引起剥脱性皮炎1例

张克民 张庆红 (山东省滨州地区中心医院, 滨州 251700)

患者女, 30 a。因双膝关节疼70 d于1996年5月4日就诊于我院外科。经检查诊断为“风湿性关节炎”。给予非普拉宗片(济南金泰制药厂生产, 批号: 951203) 200 mg bid。10 d后膝关节疼痛明显减轻, 但双手及双足出现红色丘疹并瘙痒难忍, 患者自觉停药, 未做特殊处理。2 d后见皮损无明显好转而再次就诊。查体: T 37.5°C, 双手及双足满足大小不等的丘疱疹, 部分已破溃结痂, 并有片状上皮脱落。患者近3个月来未用其它药物, 非过敏体质, 请皮肤科会诊确诊为非普拉宗所致的剥脱性皮炎。给予氢化考的松200 mg, 能量合剂及维生素C

等药物静点, 同时用炉甘石洗剂外洗患处, 1 wk后治愈, 随诊2 mo无复发。

讨论: 非普拉宗为非甾体消炎药物。其主要特征是其化学结构中引入了有抗溃疡作用的功能基—戊烯基, 使之既保留了强力的消炎镇痛作用, 又减轻了毒副作用, 尤其避免了同类药物对胃粘膜的不良刺激作用。我们在临床应用过程中确觉其疗效肯定, 不良反应较少。虽然象本例这样较严重的不良反应极为少见, 但仍应引起同道们注意。

收稿日期: 1996—09—09