

非诺贝特致男性性功能障碍1例

陈龙英 陆 华 (广西医科大学第一附属医院, 南宁 530027)

病人, 男性, 45岁, 因1995年11月体检时发现血脂偏高, 总胆固醇6.92 mmol/L(正常值3.10~6.10), 于1995年12月10日来院就诊。门诊医师给予非诺贝特片剂(徐州第三制药厂 批号950204)100片, 0.1g, po, tid, 未并用其它药物。病人服药10d以后, 出现肩部及四肢肌肉松弛、腿软、乏力等症状。用药30d后, 病人性功能逐渐减退。1996年3月开始出现性欲丧失, 阳萎。来院诊治, 测定性激素水平, 睾酮为646 ng/dL, 远低于正常值, 经男性科使用安雄(十一酸睾酮)等药物治疗, 未见效。至1997年2月病人停服非诺贝特一年后复

查, 性功能仍未恢复。

讨论 非诺贝特(Fenofibrate)为氯贝丁酸类降血脂药, 临床常用于治疗高脂血症。该药的疗效确切, 耐受性好。不良反应有胃肠道反应、肌痛和脱发, 偶见血转氨酶及尿素氮升高。关于该药引起性功能障碍的临床病例, 国内期刊尚未见报道。该例病人既往身体健康, 性功能正常, 育有一子, 夫妻感情和睦。病人服药后出现性功能逐渐减退, 进而丧失, 考虑为非诺贝特引起。临床在应用该药时, 应引起注意。

收稿日期: 1997—05—13