

尼莫通致过敏性皮疹及红肿 1 例

郭英芳 向定亚 (新疆伊犁洲友谊医院, 伊犁 835000)

患者,女,40a。因左侧肢体发麻,颈部僵硬而就疹,经 TCD 检查示:脑血管狭窄。口服舒血宁(桂林红会制药厂,批号为 950203)9.6mg, Bid; 舒脑宁(意大利宝利化大药厂,批号为 25794)2.5mg, Bid; 澡酸双脂钠(天津市北方制药厂,批号为 940908)100mg, Tid。口服 3d 后又加服尼莫通(德国拜耳公司, 483791/M-2)30mg, Tid。加服尼莫通后脸部就出现不适,发痒,因症状较轻没有注意,连服 3d 出现满脸通红,面部出皮疹,奇痒,脸潮红,耳鼓膜胀痛,鼻梁红肿,疼痛,上体双胸前,两肋下胀痛难忍。由于此症状出现在加服尼莫通之后,故考虑可能是由尼莫

通引起,患者自行停服尼莫通,其它药品继续服用,上述症状开始缓解,停药四天后,此症状才逐渐消失。可见此过敏反应由尼莫通引起。

讨论:尼莫通的有效成份是尼莫地平,它作用于神经元,优先作用于脑部小血管。目前广泛用于脑血管疾病,临床上尼莫通所致的不良反应时有发生,但一般症状都较轻。本例过敏反应比较严重,但因及时停药,症状恢复快。本例不良反应,提醒患者及医务人员,在使用尼莫通时,医生应向患者交待其过敏反应发生的可能性,一旦发生及时就诊或自行停药。

收稿日期:1997-07-10