

优布芬致子宫出血 1 例

熊洪群 (四川省三台县西平医院, 西平 621104)

患者,女,40a,因双手指掌和近侧指间关节肿胀、疼痛、活动障碍而服用优布芬(酮洛芬)肠溶胶囊(西南合成制药股份有限公司生产,批号961110),50mg, tid。4d后,患者感关节肿胀减轻,疼痛明显缓解,但就在此时,月经仅过1周的患者却出现了阴道出血。妇科医师检查后,认为是子宫出血。考虑到患者的子宫出血是在服用优布芬过程中出现的,在此期间没服其他药物,无其他原因可查,因而拟诊是优布芬药物所致。嘱患者今后慎用优布芬,并立即予以停用,口服安络血、肌注维生素K₃等,3d后,阴道出血逐渐停止而恢复正常。2mo后,患者又因双手指间关节肿胀复发,疼痛明显加重,自

已再次服用优布芬,3d后,不应是经期的患者又出现阴道出血。此表明,患者子宫出血系优布芬药物所致。

讨论:优布芬为非甾类解热、镇痛、抗炎药物,常用于治疗风湿、类风湿性关节炎、肌炎、骨关节炎、痛风和妇女经痛等。其主要副作用为胃肠道反应,偶有皮疹、哮喘等过敏反应发生。优布芬引起子宫出血还未见报道,其机理亦不清楚。推测,可能是患者特异体质,其子宫出血,是优布芬引起的一种以子宫内 膜损害为其主要特征的过敏性反应。此病例提示,应用优布芬治疗妇女经痛宜慎重。

收稿日期:1997-05