

倍他乐克致齿龈出血 1 例

季方茹 曲红玉 潘红秀(佳木斯 154002 佳木斯医学院第一附属医院)

患者男,60岁。以头晕头胀伴耳鸣十余年,加重一周于1998年3月5日入院。入院查体:T36.4℃,P90次/min,R19次/min,Bp23.0/13.9kpa。心界向左扩大,心率90次/min,主动脉第二音亢进,节律规则。心尖区及主动脉第二听诊区均闻及II级以上收缩期杂音。根据临床症状及物理诊断确诊为高血压病II期。给倍他乐克(阿斯特拉(无锡)制药有限公司,批号:9704023)100mg每日2次口服。3d后头晕明显好转,心率72次/min,血压维持在21.3/12.3kpa,第4天患者出现齿龈

出血症状,全身皮肤粘膜无出血点及瘀斑。此期间患者未用过抗凝药物,以前从未有过齿龈出血现象,血常规及凝血酶原时间无异常改变。考虑与服用倍他乐克有关,于是停止服用倍他乐克,第3天齿龈出血停止。

讨论:倍他乐克是一种以 β_1 肾上腺能受体阻滞作用为主(心脏选择性)的药物,很适合于治疗高血压。此患者未用其它药物,且停药后齿龈出血现象消失。该患齿龈出血系服用倍他乐克所致,这在我院尚属首例,应引起注意。

收稿日期:1998-09-21