

复方阿司匹林片致窒息 1 例

马玉凤 刘新暇 吴翠美¹ (文登 264400 山东文登市中心医院; ¹ 山东烟台市职业病医院)

患者女, 38 岁。因自觉感冒于 2pm 自行口服 2 片复方阿斯匹林, 晚上睡觉时约 10pm 突然感胸闷、憋气, 且逐渐加重出现呼吸急促, 约 30 次/min, 面色苍白, 口唇紫绀, 四肢湿冷, 心率不快, 84 次/min, 血压正常, 19/11 KPa, 考虑为复方阿司匹林所引起的过敏反应。因农村无氧气未给吸氧, 立即给 0.1% 盐酸肾上腺素 1 mg 皮下注射, 25% GS 20 ml, 喘定 0.25 iv 后症状无明显好转, 于 10:20pm 突然意识丧失, 呼吸停止, 心跳存在, 瞳孔对光反射存在, 立即行口对口人工呼吸, 针刺人中, 再次皮下注射 0.1% 盐酸肾上腺素 1 mg, 可拉明 0.375, 洛贝林 3 mg iv, 10:25pm 病人意识恢复, 呼吸也恢复, 但有

点急促, 给 5% GS 250 ml, 可拉明 1.125, 洛贝林 9 mg iv drip, 于 10:40pm 病人呼吸渐平稳, 病情基本稳定, 于 11:30pm 液体滴完, 病情稳定。

讨论: 复方阿司匹林片 (简称 APC), 为常用的解热镇痛药, 其成份为阿司匹林、非那西丁、咖啡因, 其副作用及毒性为偶有恶心、呕吐, 特异体质者可发生皮疹、气喘等。象此病人出现窒息现象还未曾有报道。此病人以往无药物过敏史, 曾服过 APC, 且这次服的 APC 是刚买了几天的, 未过有效期。请同行在给病人服此药时要注意有此现象发生的可能。

收稿日期: 1998 - 08 - 10