

口服感冒通引起喉头水肿 2 例

谭清爽 贾玉礼(文登 264400 山东文登中心医院)

感冒通用于感冒的治疗,其不良反应主要表现为头晕、头痛、皮疹,亦可引起肠道紊乱。我们於临床中发现 2 例患者因服用本品引起喉头水肿,现报道如下。

例 1:患者男 39 岁,96 年 12 月 17 日,因感冒服用感冒通片(青岛生物化学制药厂生产,批号:930917)2 片,半小时后感喉部痒,且逐渐加重,感咽喉部似有物,及至逐渐感有梗塞感,约 2 小时后感呼吸困难,急来院求治。查体:见患者神志清,面色青紫,呼吸困难,喉部明显充血肿胀。询问用药史,患

者近期末服用任何其它药物。断为感冒通所致急性喉头水肿。即给用 5% GS 20 ml 加地塞米松 10 mg 静注,非那根 25 mg 肌注;并给予吸氧。约 20 分钟后梗塞感及呼吸困难感渐渐消失,改服用地塞米松 0.75 mg,非那根 25 mg, tid。2 天后完全恢复,随访一周健康无恙。

例 2:患者男,21 岁,因上感口服感冒通片(山西省曙光制药厂生产,批号:99121802)2 片, tid。2 天后感咽喉部痒感,没在意,继续服药,第 3 天下午 3 点左右咽部痒感加重且觉

似有物, 逐渐感有阻塞状, 至 4 点感胸闷, 及至呼吸困难, 急来院诊治。查体见: 患者唇青面紫, 呼吸困难, 咽喉部充血肿胀明显。询问病史用药情况, 患者回答向来身健, 以前无服用任何它药, 断为服用感冒通所致喉头水肿。即给予 5% GS 20 m l, 氟美松 10 m g iv; 非那根 25 m g im, 并给予吸氧。约半小时后梗塞感及呼吸困难感渐渐消失, 改服用地塞米松 0. 75 m g、非那根 25 m g tid。3 天后恢复正常, 随访 17 天, 症状无复

发。

上述两例患者用药厂家不同, 服用感冒通期间, 没服用任何其它药物, 纯系本品所致不良反应无疑。其引起的喉头水肿可能与个体差异有关, 待以后研究。今报道目的在于引起我们临床医务人员的注意。

收稿日期: 2000- 08- 07