

# 血栓通注射液可致过敏反应

朱丽敏 孙书华<sup>1</sup> (石家庄 050000 河北医科大学第二医院门诊办;<sup>1</sup> 石家庄 050000 河北医科大学第二医院脑内科)

患者,男,60岁,因言语不清9d,加重伴饮水呛咳,右侧肢体活动不利1d,於2001年7月19日入院。查体T37℃,Bp190/90mmHg,神清,不完全运动性失语,头颅CT示:双侧基底节区脑梗塞。给予三组液体静脉输入。(1)2%甘露醇125ml, Bid; (2)0.9%生理盐水300ml, 洲邦160mg, qd; (3)5%葡萄糖盐水500ml, 25%硫酸镁10ml, 脑复素20ml, 10%氯化钾10ml, 胰岛素6u, qd; 用药后13d加用5%葡萄糖盐水300ml, 血栓通20ml, qd; 输入此组药液2h后,患者突然出现发冷,全身寒战,体温达38.4~39.3℃, Bp: 190/95mmHg, HR: 112次/min, R: 26次/min, 即请大夫看过患者考虑输液反应,马上停用该组药液,改换另一组液体,并给氟美松10mg入壶,苯海拉明20mg,安痛定2ml肌注,症状逐渐好转,体温降至正常,以后再未出现类似情况。

血栓通注射液(哈尔滨圣泰制药有限公司,批号:

001210)此药是从名贵中药材三七中提取的三七总皂苷,是治疗心脑血管疾病的良药,能增强机体功能,具有增加血流量,扩张血管,降低动脉血压,改善微循环,抑制血小板聚集,降低血粘度等作用,此药在临床应用以来,从未出现过不良反应。

讨论:此次患者静脉点滴血栓通注射液。(1)是在无菌操作下,按要求加入药液稀释配制,未与其它药物配伍,故可排除其它药物致敏的可能性。(2)输液滴速正常,60滴/min,是在该药液输入一半多时出现此症状。(3)在输此药以前未有不适反应。无上感症状,在停用此药后未再出现不适反应,因此考虑患者输液反应系血栓通注射液所致。

故提示大家在今后应用此药物时应慎重,应当引起临床医生足够重视。

收稿日期:2002-01-07