

# 甲硝唑致过敏性荨麻疹 1 例

陈树英,张永萍,孙钦松(山东省胜利石油管理局胜利医院,山东 东营 257055)

中图分类号:R982

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2003)06-0488-01

甲硝唑具有抗厌氧菌的作用,可用于治疗厌氧杆菌引起的炎症,现临床已广泛应用于阑尾、结肠手术、妇产科手术的围手术期及术后治疗,对降低或避免手术感染起到了很好的效果。随着本品应用的增多,不良反应的发生也在增加,现报道一经静脉注射甲硝唑致双脚固定型及全身荨麻疹一例,为减少患者的痛苦,望临床医生给以重视。

患者,女,43岁,因慢性阑尾炎反复发作,行阑尾切除术,术后用甲硝唑葡萄糖注射液(青州尧王制药有限公司,批号02110606-5)250 mL $\times$ 2,洁霉素1.2g,丁胺卡那霉素0.4g,iv gtt, qd。用药当晚,患者双脚瘙痒难忍,d2,双脚红肿,起满红色荨麻疹,并迅速波及全身,立即停用甲硝唑葡萄糖注射

液,改用济得(替硝唑注射液),口服阿司咪唑(息斯敏)3 mg, qd,10%葡萄糖酸钙20 mL,iv, qd。局部涂以炉甘石洗剂止痒,1周后,全身皮疹及双脚红肿开始逐渐消退,后退皮痊愈。

患者几年前,曾因口角炎而服用甲硝唑片0.2g $\times$ 2片,6h后,双脚瘙痒,15h后双脚红肿并布满红疹,奇痒,经口服仙特敏10 mg,地塞米松10 mg, qd。1周后,红肿及皮疹逐渐消退,退皮痊愈。

此患者,第一次口服甲硝唑片,仅双脚红肿,出现荨麻疹,第二次静脉注射,双脚上述症状重现且更加严重,并波及全身,用抗过敏治疗均有效果,可确定为甲硝唑过敏。

收稿日期:2003-01-27