

来立信致严重高血压 1 例

刘爱英,刘剑(河北医科大学第二医院,石家庄 050000)

中图分类号:R978.27 文献标识码:B 文章编号:1007-7693(2003)06-0529-01

患者男,90岁。因发烧3d,伴有头痛,无咳嗽及咽痛,即往体健,无高血压病史。体检:T38℃,咽部充血,两肺呼吸音稍粗,两肺偶闻干鸣声,心律70次/min,律整,血常规:WBC $19.9 \times 10^9/L$,中性84%,X线片示:支气管炎,右下肺炎。2002年12月18日给予复方鲜竹沥水20mL,tid,青霉素800万单位,加入0.9%氯化钠注射液250mL,qd,静脉滴注,5%葡萄糖注射液150mL加入鱼腥草注射液50mL,qd,静脉滴注,用药3d。12月21日患者仍发烧,头痛,无咳嗽,体检:T38.8℃,两肺呼吸稍粗,干鸣声,心律70次/min,律整。改用0.9%氯化钠注射液250mL加入头孢唑林钠5.0g,1/d,静脉滴注,连用2d。12月23日患者仍发烧,无咳嗽,排尿顺利,体检:T39℃,心律整,未闻及杂音,两肺无啰音,血常规:WBC $13.7 \times 10^9/L$,X线片示:肺炎及胸膜病变。根据患者病情改用以下治疗方案:(1)来立信注射液(乳酸左氧氟沙星注射液,浙江医药股份有限公司新昌制药厂,批号:0206182)0.2g/100mL,qd,静脉滴注。(2)欣安林(氨苄西林钠/舒巴坦

钠)3g,加入到0.9%氯化钠注射液250mL,qd,静脉滴注。(3)口服伯舒(布伪麻黄片)。当第一组液体来立信静脉滴注40min时,患者出现发冷、发抖、胸闷手足发凉,体检:T39.7℃,BP190/110mmHg,心律104次/min,神志清。立即停输来立信,给予吸氧,5%葡萄糖注射液加入维生素C2.0g,静脉滴注,地塞米松5mg入壶。心痛定10mg舌下含服,安痛定2mL,柴胡2mL肌肉注射,物理降温,20min后患者血压下降到140/90mmHg,心律80次/min,神志清,呼吸正常,心电图:T波低平,早搏4~6次/min,继续观察病情变化。停用来立信,继用欣安林等药物治疗,无不良反应发生。12月24日,患者体温、心律、血压均恢复正常,要求出院继续治疗。

讨论:患者应用乳酸左氧氟沙星致高血压,停用乳酸左氧氟沙星后症状缓解,故血压升高系乳酸左氧氟沙星所致,机制尚不清楚。提示:选择乳酸左氧氟沙星时,高血压患者应慎用,谨防该不良反应的发生。

收稿日期:2003-01-08