

# 巴特日七味丸引起严重药疹 1 例

王书杰,王丽萍(解放军第 251 医院药材料,河北 张家口 075000)

中图分类号:R758.25

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2004)06-0479-01

患者,女,34岁,由于咽部疼痛来我院诊治。查:咽部中度红肿充血, $T_{36.2}^{\circ}\text{C}$ , $P_{69}$ 次 $\cdot\text{min}^{-1}$ , $R_{20}$ 次 $\cdot\text{min}^{-1}$ , $Bp_{17.5/8.5}$ Kpa, $WBC_{10}\times 10^9/L$ 。考虑她有青霉素过敏史,只给予巴特日七味丸(内蒙古蒙药股份有限公司生产,批号:021211,国药准字Z15020389)9粒,bid,po,于第一次服药后2h,出现双膝关节内侧痒疹,可见较密集米粒大小的红色粟粒疹,突出皮肤。持续服药,第2天患者躯干及四肢可见同样样疹,压之不褪色,基底部皮肤红,痒疹难忍,双膝关节尤为严重,部分皮疹出现破溃并有液体渗出。询问患者近日并未服用其他药品及致敏性食物,认为是由巴特日七味丸引起,故令其立即停服该药。给予脱敏治疗,地塞米松磷酸钠注射液10mg+维生素C注射液2g+10%葡萄糖注射液

500mL,qd,iv,同时用10%葡萄糖酸钙注射液10mL,qd,静推,治疗3d后周身皮疹全部消退,皮肤色泽恢复正常,双膝关节处破溃愈合,未留任何斑迹。

讨论:巴特日七味丸的主要成分为:草乌叶、诃子、翻白草、茜草、黑芸香、麝香、银朱。它具有清瘟解毒,消“黏”止痛,散淤之功效。患者由于对青霉素过敏,可能是一个高敏患者,再加上自身免疫力降低,因而中成药中某一成份就可能成为特异性的过敏源,引起过敏。随着中药行业的不断发展,中药制剂越来越多,所致过敏反应的报道呈上升趋势,因此对中成药引起的过敏反应必须高度重视,保证用药的安全、有效。

收稿日期:2004-03-25