

布洛芬致耳鸣和多形性红斑 1 例

骆卫琴, 高真(浙江省长兴人民医院, 浙江 长兴 313100)

中图分类号: R994. 11, R971. 1

文献标识码: B

文章编号: 1007-7693(2009)01-0084-01

患儿男, 8 岁。因咳嗽, 流涕, 咽痛伴发热于本院门诊就诊, 诊断为急性上呼吸道感染。测体温 $39.5\text{ }^{\circ}\text{C}$, 立即予布洛芬混悬液(上海强生公司, 批号 070524149) 8 mL 口服, 给药 20 min 后患者出现耳鸣、胸闷、面色苍白并出现皮肤风团样皮疹及多形性红斑。体检示: 神志尚清, BP 90/67. 5 mmHg (12/9 kPa), HR 105 次 $\cdot\text{min}^{-1}$ 。诊断: 布洛芬过敏反应。立即采取患儿平卧, 吸氧, 予地塞米松静脉推注并予 10% 葡萄糖酸钙 10 mL 加入 10% 葡萄糖液静脉滴注等措施。皮疹缓慢缓解, 耳鸣、胸闷、面色苍白等症状逐渐消失。患儿无过敏体质, 曾因发热多次口

服布洛芬未见不适。

讨论: 布洛芬是非甾体抗炎药物, 是临床上常用的解热镇痛药物。常用于头痛和(或)发热, 而布洛芬作为其中一类相对比较安全的药物, 已长期应用于儿童退热方面。非甾体抗炎药物可引起多种不良反应, 包括耳鸣和多形性红斑, 但比较少见。非甾体抗炎药物的不良反应仍是一个棘手的临床课题, 即使是新型药物也还存在不良反应, 建议临床医生用药时要引起注意。

收稿日期: 2008-06-13