

· 安全用药 ·

氨力农引起剥脱性皮炎 1例

莫美娟 (浙江省绍兴市人民医院, 绍兴 312000)

氨力农(Amrinone, Amr)系一种非洋地黄, 非儿茶酚胺类强心药, 具有轻度扩血管作用可降低心脏前负荷, 适用于各种类型充血性心力衰竭, 尤其对洋地黄、利尿剂及扩血管药物治疗无效的心力衰竭患者, 主要副作用有血小板减少, 胃肠道不适, 各类皮疹。

患者男, 48 a, 因反复胸闷、气急5年, 症状加重1 wk伴尿少、浮肿、吐泻而于1993年9月7日以扩张型心肌病、全心衰第10次入院。住院后予狄高辛、速尿、开搏通等强心、利尿、扩血管治疗2 wk, 心衰症状未能控制, 于9月21日加用Amr(山东济南齐鲁制药厂生产, 批号930104) 50 mg + 生理盐水20 ml静注后再用Amr 100 mg + 生理盐水

180 ml静滴(慢滴6 h)每日1次, 1 wk后患者两下肢出现皮疹伴搔痒, 疑为Amr过敏性皮疹, 停用该药, 予息斯敏口服, 皮疹及搔痒症状逐渐好转。10月17日因气急、浮肿、少尿再次加重, 考虑该患者以前应用Amr效果较好而再次予Amr静注后静滴, 次日患者面色潮红、肿胀, 四肢及躯干皮肤大片红疹并逐渐融合, 立即停用Amr, 并用地塞米松10 mg静滴9 d, 1 wk后全身皮肤广泛脱屑, 四肢呈手套、袜子状, 口腔粘膜重度糜烂, 喉头有黄色粘膜状脱落物。11月1日因急性肾衰、高血钾致死。