

## 催产素引起严重过敏 1例

陈伟氏 (甘肃省人民医院, 兰州 730000)

初产妇某, 27 a, 妊38<sup>+</sup>wk待产, 入院。无早产、流产史, 孕早期无毒物、放射线等接触史, 孕中、晚期无头晕、头痛、感染等, 个人无特殊嗜好, 否认家族遗传史, 无药物过敏史, 无心脏病、高血压史。T 36.6°C, 心率96次/min, Bp105/70mmHg。

入院一周后, 为了避免胎盘早衰, 决定静脉滴注催产素。催产素10单位(上海天丰药厂生产, 批号920406—3)加入10%葡萄糖注射液500ml中静滴, 滴速24滴/min, 10min后产妇面色苍白, 头晕, 气短、心悸, 四肢末梢神经发麻、发凉、甲床发绀, 心率106次/min, 心律不齐, Bp110/80mmHg,

H<sub>R</sub>88次/min, 胎心152次/min, 心电图示偶发房早博。立即停止静脉滴注催产素, 肌内注射地塞米松5mg, 盐酸非那根25mg, 吸氧, 12h后症状基本消失。Bp110/70mmHg, H<sub>R</sub>108次/min, 心律齐, 胎心136次/min。为了慎重, 转入监护病房监护, 间断吸氧。两天后顺产一女婴(行会阴侧切缝合术), 重3200g, 评8分, 为足月新生儿。

此产妇无药物过敏史, 当天未用其他药物, 所用10%葡萄糖注射液为本院自制, 整试验阴性, 本批注射液使用时未发现不良反应, 故经过临床有关科室会诊讨论, 认为本病例是催产素过敏所致。

收稿日期: 1993-11-22