

氯唑沙宗片引起过敏1例

叶 茵 (浙江师范大学医务室, 金华 321004)

患者男, 35 a。95年4月2日上午因左肩关节周围肌肉疼痛难忍来门诊治疗。诊断为: 急性软组织挫伤。处方用氯唑沙宗片(江苏省东台市制药厂生产, 批号为940915), 0.4 g/tid \times 4d。同时关节镇痛膏外贴。d 4后肩关节周围疼痛减轻, 抬手活动仍有疼痛感觉。但四肢发现粉红色疹点, 并发痒。因不明原因, d 5继续服氯唑沙宗片, 停贴关节镇痛膏。七日下午四肢躯干及全身各部位都出现大小不等的红色针刺状点。瘙痒, 烦躁不安; 但无发热、心跳、血压升高等其它反应。停药氯唑沙宗片。改用抗过敏治疗, 葡萄糖酸钙针剂 10 ml/qd 静脉推注, 连用3天。口服息斯敏10 mg/qd \times 3d。十日再次来我医务室门诊治疗。全身及四肢针状红点未继续

发展, 全身瘙痒仍存在。改用5%GNS 500cc加地塞米松10mg, 再加 Vit_c 2g/qd \times 3d, 静脉滴注。继续口服息斯敏10 mg/qd \times 3d, 抗过敏治疗一周后全身症状消失。

患者平时身体健康, 肝肾功能正常, 未发现有过敏性体质。氯唑沙宗片属中枢性肌肉松弛药, 用于各种急慢性扭伤、挫伤、肌肉劳损等引起的肌肉痉挛痛等。肝肾功能正常人一般都无反应。氯唑沙宗在我门诊已使用几年, 未发现过敏反应。此例患者的过敏现象, 确属个别病例过敏反应, 应引起医务人员注意。

收稿日期: 1995—10—24