

金嗓散结丸致皮肤过敏 1 例

金立玲 (浙江省绍兴市人民医院, 绍兴 312000)

金立丹 (浙江省绍兴第二医院, 绍兴 312000)

金嗓散结丸是由桃仁、红花、浙贝母、鸡内金、金银花、蒲公英、麦冬及木蝴蝶等药物组成，具有清热解毒、活血化瘀、健脾利湿化痰之功效，常用于声带小结、声带息肉、声带粘膜增厚及由此引起的声音嘶哑等症。在使用过程中笔者发现该药引起过敏反应一例，现报告如下：

患者女，35岁。因声带息肉小结入院手术，术后10天出院，医嘱口服金嗓散结丸(西安碑林制药厂)60粒，Bid。用药一天后，患者全身皮肤出现红

色斑点，瘙痒，搔后出现红色丘疹。立即停药，静推10%葡萄糖酸钙10ml，次日症状逐渐好转，二天后皮疹消失，再次服用该药，出现上述类似症状，停药后对症处理，皮疹逐渐消失。

追问病史，患者既往无过敏史，该例两次服用金嗓散结丸后，均出现过敏症状，诊断为金嗓散结丸致皮肤过敏。该药是由多种成分组成，此例究竟是对某一种或几种成分过敏，还得进一步观察和探讨。

收稿日期：1997—02—26