

口服大剂量阿米替林致中毒 1 例

吴结柱 何曼玲 (新疆石油局乌鲁木齐医院, 乌鲁木齐 830000)

患者, 女, 59岁, 于1996年8月28日12时服用阿米替林片 $25\text{mg} \times 50$ 片。服后约1h, 神志不清, 面色苍白, 呼之不应。查体: $T35^\circ\text{C}$, $p117$ 次/min, $R22$ 次/min, $BP14/10\text{kpa}$, 呈昏迷状态, 全身皮肤粘膜无黄染及出血点, 浅表淋巴结无肿大, 压眶无射, 两侧瞳孔等圆固定, 对光反射迟钝。颈软, 口鼻无歪斜, 咽部无充血, 双肺痰鸣音, 心率117次/min, 节律齐。查: $WBC9.21 \times 10^9/\text{L}$, $N: 0.83$, 血糖 26.9mmol/L , 心电图未见异常, 立即吸氧, 用温水 10000ml 洗胃, 同时肌注速尿 20mg , 静滴 10% 葡萄液等对症治疗。约在4h后患者突然呼吸表浅, 节律不整, 面色由苍白转青紫, 口唇发绀明显, 呼吸困难, 心率加快, 血压升高。立刻吸痰, 同时给予人工呼吸器辅助呼吸

及静注尼可刹米 0.375g , 洛贝林 3mg , 并进行气管插管术。呼吸逐渐平稳, 继降压、补液、利尿等对症治疗。3d后, 体温、血压、心率渐恢复正常, 呼吸平稳, 患者转危为安。

讨论: 阿米替林是抗抑郁症的常用药物, 其副作用比同类药少。一日最大剂量为 300mg , 该患者一次服用 1250mg , 是最大量的4倍之多。阿米替林致中毒反应未见报道。临床主要表现为深昏迷, 心率加快, 血压升高, 呼吸困难。均为阿米替林副作用所致。因抢救及时而脱险, 建议对各医疗单位的药品加强管理。故报告1例, 以引起重视, 确保病人的用药安全有效。

收稿日期: 1997—05