

拜糖平致严重头痛 1 例

林鹏鑫(揭阳 522000 广东揭阳市人民医院)

患者男,70岁。因非胰岛素依赖型糖尿病(Ⅱ型糖尿病)而入院。患者1986年首发糖尿病,经口服降血糖药治疗,病情得到控制。常用药物有消渴丸,优降糖,苯乙双胍等。1994年起因病情变化改服达美康(格列齐特)治疗,病情稳定。这次因饮食控制不当等原因,病情加重入院治疗。开始以胰岛素加达美康治疗,后因其餐后血糖仍较高,加服拜糖平(德国拜尔公司,有效期至1998年9月)100mg,于晚餐起开始服用。患者服药后当晚出现严重头昏头痛、全身不适症状。第2

天停用拜糖平,不良反应症状消失。患者追述10年前曾服用甲苯磺丁脲(D_{860})时,也出现过严重头痛症状,后改服其它降血糖药均无此反应。

拜糖平(阿卡波糖)是新一类口服降血糖药,是一种 α -葡萄糖苷酶抑制剂。其主要副作用是出现胀气,肠鸣响,偶而有腹泻和腹痛。发生严重头痛的不良反应尚未见报道,因此提请临床用药注意。

收稿日期:1997-12-24