

先福吡兰致不良反应 1 例

魏雪梅 郭爱华(乌鲁木齐 830001 新疆维吾尔自治区人民医院)

患者男,54岁。因反复咳嗽、咳痰15年,胸闷、气短5年加重半月入院。既往无哮喘发作史,无药物过敏史。查体:桶状胸,肋间隙增宽,双肺语颤减弱,双肺呼吸音粗,两下肺少量细湿性罗音。心率106次/min,律齐,各心脏瓣膜区未闻及病理性杂音。心电图示:窦速,右房右室肥厚。肺功能示:混合型肺通气功能障碍。胸片:慢支、肺气肿、肺心病。患者入院后感咳嗽、气短,予菌必治针剂2.0g/日,静点抗炎10d效不佳。故换用先福吡兰针剂1.0g,2次每日静点。用药前做先锋霉素VI皮试阴性。静点先福吡兰(日本住友制药株式会社,制造编码LN747,最终有效期至1999年7月,剂型为粉针剂)开始后约10min,患者出现窒息感伴心慌胸闷,气短,气喘及颜面潮红、寒战等症状。查体:两肺满布哮鸣音。心率134次/分,律齐。呼吸30次/分,血压210/110mmHg。立即停用先福吡兰针剂,予心痛

定10mg,舒喘灵4.8mg口服,并肌注非那根25mg,静脉推注地塞米松5mg治疗。症状约30min后缓解。患者喉部窒息感减轻,查体两肺哮鸣音明显减少,血压140/80mmHg。

讨论:先福吡兰为新引进的头孢菌素类抗菌素。主要适用于革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌,对绿脓杆菌有很强的抗菌力。杀菌作用强,对各种细菌产生的 β 内酰胺酶稳定。本例患者既往无哮喘发作及头孢菌素类药物过敏史。用药前患者两肺无哮鸣音,用药后10min出现气短、哮喘样发作、颜面潮红、窒息感等症状。两肺查体可闻及满布的哮鸣音。予抗过敏治疗后约30min症状缓解,两肺哮鸣音明显减少。因此考虑系先福吡兰导致该病人哮喘样发作。

收稿日期:1998-07-06