

复方阿司匹林片致窒息 1 例

马玉凤 刘新暇(烟台 264400 山东烟台市职业病医院)

患者女,38岁。因自觉感冒于2pm自行口服2片复方阿斯匹林,晚上睡觉时约10pm突然感胸闷、憋气,且逐渐加重出现呼吸急促,约30次/min,面色苍白,口唇紫绀,四肢湿冷,心率不快,84次/min,血压正常,19/11KPa,考虑为复方阿司匹林所引起的过敏反应。因农村无氧气未给吸氧,立即给0.1%盐酸肾上腺素1mg皮下注射,25%GS20ml,喘定0.25iv后症状无明显好转,于10:20pm突然意识丧失,呼吸停止,心跳存在,瞳孔对光反射存在,立即行口对口人工呼吸,针刺人中,再次皮下注射0.1%盐酸肾上腺素1mg,可拉明0.375,洛贝林3mgiv,10:25pm病人意识恢复,呼吸也恢复,但有

点急促,给5%GS250ml,可拉明1.125,洛贝林9mgivdrip,于10:40pm病人呼吸渐平稳,病情基本稳定,于11:30pm液体滴完,病情稳定。

讨论:复方阿司匹林片(简称APC),为常用的解热镇痛药,其成份为阿司匹林、非那西丁、咖啡因,其副作用及毒性为偶有恶心、呕吐,特异体质者可发生皮疹、气喘等。象此病人出现窒息现象还未曾有报道。此病人以往无药物过敏史,曾服过APC,且这次服的APC是刚买了几天的,未过有效期。请同行在给病人服此药时要注意有此现象发生的可能。

收稿日期:1998-08-10

中国现代应用药理学杂志1999年10月第16卷第5期