

罗红霉素致皮肤过敏 1 例

赵俊东(深圳 518066 招商局蛇口工业区联合医院)

患者男,37岁。因患前列腺炎于1998年11月来我院外科诊治,服用阿奇霉素,一次0.5,一日3次。2d后因效果不明显而停药。于同年12月改服罗红霉素(江苏扬子江制药厂,批号:981025),一次0.15,一日2次。服用4片后,上肢出现多量针尖大小红点,以内侧多见,分布对称,伴搔痒,不伴腹痛及关节症状。立即停药罗红霉素,转皮肤科治疗。口服特非那丁,一次0.06,一日2次,肌注苯海拉明20mg、胶性钙2ml,一日1次,后症状改善。询问病史,近一段时间内未服食鱼虾等过敏物质,但有青霉素皮试阳性史。查体T 36℃,P 80次/min,R 20次/min,BP 120mg/80,WBC 9×10^3 ,中性分叶60%,其他无异常。

罗红霉素是大环内酯类抗生素,具有口服吸收好,血药浓度高,半衰期长,抗菌作用较红霉素强的特点。其常见不良反应是胃肠道反应如恶心、腹痛、腹泻等,罕见有皮疹。曾有致过敏性紫癜的报导。本病例因服用罗红霉素,当时未与其他药物配伍,故可排除他药致敏的可能性。根据其典型的临床表现,可确诊为皮肤过敏。

本例患者仅有青霉素皮试阳性史,从未用过罗红霉素,今首次用药即发生皮肤过敏。应当引起临床医生足够重视。

收稿日期:1999-07-12