

## · 不良反应 ·

### 静滴鱼腥草致过敏性休克 1 例

潘根丽(德清 313216 浙江省德清县人民医院)

患儿,男 22 月。因咳嗽 2 天入院。查体:体温  $37.0^{\circ}\text{C}$ , 脉搏 110 次/m in, 呼吸 24 次/m in, 神志清, 精神可, 咽充血, 双肺可闻及少许粗湿罗音, 心腹及神经系统检查阴性。血常规白细胞计数为  $10.2 \times 10^9/\text{L}$ , 中性 0.53, 入院诊断:急性支气管炎。予鱼腥草针 10m l 加入 5% 葡萄糖液 100m l 静滴后仅 5m in 患儿出现憋气, 口唇四肢紫绀, 四肢厥冷, 心率 80 次/m in, 心音低钝, 血压降至 8/6kPa, 考虑鱼腥草过敏反应, 立即停用并给予吸氧, 静注肾上腺素 0.3mg, DXM 3mg, 约 3m in 后患儿憋气缓解, 面色转红润, 血压恢复至 11/8kPa。患

儿既往有青霉素过敏史。

本例患儿于静滴鱼腥草仅 5 分钟出现休克征象, 给予肾上腺素及停用鱼腥草后症状迅速缓解, 且患儿既往有药物过敏史, 故鱼腥草致过敏性休克诊断成立。临床上我们应用鱼腥草时偶见有皮疹出现, 但引起过敏性休克者尚属首例, 我们分析可能与用药者的体质因素有关。因此临床上遇到类似过敏体质患儿, 应谨慎使用鱼腥草注射液。

收稿日期: 2000- 09- 05