

注射用阿奇霉素以腹痛为先兆的过敏性休克 1 例

严新华,余佩珍(兰州军区乌鲁木齐总医院专病中心,新疆 乌鲁木齐 830000)

中图分类号:R978.15

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2003)01-0025-01

患者女性,36岁,因患衣原体感染性阴道炎,于2002年2月8日在我院专病门诊就诊治疗。处方用药为注射用阿奇霉素0.5g(广东阳江制药厂,批号:0111392),加入250mL生理盐水内静脉滴注,40滴/min。静滴不到1min,患者即出现剧烈腹痛、恶心,数分钟后感到胸闷、全身不适,即刻终止用药,嘱患者卧床休息,当时测血压为110/70mmHg。约5min后患者出现面色苍白、呼吸急促、烦躁、大汗、四肢冰凉并伴抽搐,测血压为80/50mmHg,脉搏120/min。立即给予抗过敏、抗休克急救处理,0.5h后血压平稳,症状消失。

讨论:注射用阿奇霉素属大环内酯类抗生素,主要适应症为泌尿生殖系感染、盆腔炎、淋病、非淋菌性尿道炎等。主

要不良反应有:胃肠道反应(腹痛、恶心、腹泻);局部反应(疼痛、炎症);皮肤反应(皮疹、瘙痒);过敏反应(支气管痉挛)。患者为首次静滴阿奇霉素,在用药数分钟后即出现过敏性休克,并以腹痛为先兆症状,提示在首次应用该药时要注意询问患者有无过敏史,特别值得注意的是,当出现腹痛症状时,不能仅仅认为是大环内酯类药物所致的一般性的胃肠道反应,而应警惕是否为过敏性休克的先兆症状,并要仔细询问、密切观察有无过敏性休克的相关症状及体征,以免延误抢救时机,造成严重后果。

收稿日期:2002-03-04