

甘露聚糖肽注射液致严重过敏反应 1 例

于志英,刘世峰,孙彩艳(河南省新乡市中心医院,新乡 453000)

中图分类号:R977.6

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2003)06-0460-01

患者,男,76岁,因患冠心病住院治疗,为增强机体免疫力,于2002年11月16日9Am30min应用甘露聚糖肽注射液(曾用名:多抗甲素注射液,成都利尔药业有限公司,批号:020107,规格:5mg/支),25mg加入5%葡萄糖注射液300mL中静脉滴注,输入约10min左右,患者突然出现咳嗽、恶心、呕吐(呕吐物为胃内容物约80g),四肢皮肤瘙痒,睑结膜充血水肿。急查体:两肺闻及少量哮鸣音,未闻及湿啰音,心率85次/min,未闻及杂音,考虑为药物过敏,立即撤除该组液体,静脉注射地塞米松针10mg;肌肉注射苯海拉明针20mg;静脉滴注葡萄糖氯化钠注射液500mL加入维生素C3.0g,10%葡萄糖酸钙针10mL;给予持续吸氧3L/min。30min后患者

上述症状缓解,d2四肢皮肤瘙痒逐渐减轻。未再使用甘露聚糖肽注射液,再未出现上述症状。

讨论:甘露聚糖肽(多抗甲素)注射液是从A型链球菌培养液中提得的一种多糖,具有增强机体免疫活性,提高机体应激和防御能力。用于恶性淋巴瘤等多种肿瘤的辅助治疗,亦可预防上呼吸道感染、支气管哮喘发作等,可治疗口腔炎、创伤性溃疡。不良反应偶有-过性发热。咳嗽、恶心、呕吐、四肢皮肤瘙痒、睑结膜充血水肿等严重不良反应,少见报道,在此提示医护人员用药时密切观察引起注意。

收稿日期:2003-01-10