

红花注射液不良反应 2 例

褚福立,赵秀英(巨野县大义中心卫生院,山东 巨野 274933)

中图分类号:R969.3

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2004)03-0194-01

资料:2例患者均为女性,年龄70~74岁,经询问病史、体格检查及CT心电图等检查,1例诊断为脑梗死,高血压病Ⅲ期;1例诊断为冠状动脉粥样硬化性心脏病、不稳定性心绞痛。既往均无药物过敏史。给予红花注射液20mL加入10%GS500mL静滴,(红花注射液,万荣三九药业有限公司生产,批号030907),速度约每分钟40滴每分,给药5~10min后均出现烦躁、出汗、心率加快,血压升高等反应。发现上述症状后立即停用该组液体,给予吸氧等处理,约10min后症状缓解。

讨论:红花注射液系中药红花加工提取物,有活血化瘀功效,临床用于治疗血管闭塞性疾病,如脑梗死、冠心病等,疗效较佳,不良反应少,偶见头晕、发热或皮疹等反应。但烦躁、出汗、血压升高者较少见。本2例患者给药后即出现症状,停用该药物后症状缓解,可考虑此反应为红花过敏所致。希望临床应用此类药物时应密切观察病情,过敏体质者慎用,发现不良反应则立即停药,采取相应措施,确保患者用药安全。

收稿日期:2003-12-23