

· 不良反应 ·

头孢哌酮钠致过敏性休克 1 例

国强,陈凤英(浙江大学医学院附属妇产科医院,浙江 杭州 310006)

中图分类号:R978.11

文献标识码:B

文章编号:1007-7693(2004)05-0424-01

患者,女,25岁,孕38⁺周,2003年12月1日因胎膜早破、轻度妊高症而入院,青霉素皮试呈阴性,否认食物、药物过敏史。12月2日查体:体温37.3℃,脉搏84次/min,血压154/108 mmHg,胎心142次/min,无宫缩,为预防感染给予头孢哌酮钠针(商品名:全达,苏州中化药品工业有限公司,生产批号10403009)、氯化钠注射液20 mL(扬州中宝制药有限公司,批号031014),静脉缓慢推注。推至12 mL时,患者主诉全身发麻,检查:患者全身皮肤潮红伴水肿,呼吸急促、口齿不清、面色苍白、口唇紫绀、面部出汗较多、呕吐(胃内容物)、神志尚清;脉搏100次/min,血压62/42 mmHg。即刻给予输氧,并用地塞米松、间羟胺(阿拉明)、多巴胺、毛花苷(西地兰)、甲泼尼龙、奥美拉唑(洛赛克)、葡萄糖酸钙等对症治

疗,1h后症状有所改善。

讨论:头孢哌酮钠为半合成的第三代头孢菌素,主要用于敏感菌所致的各种感染如肺炎及其他下呼吸道感染、尿路感染、败血症、腹膜炎、盆腔感染等。据《新编药理学》(第15版)记载,头孢菌素类与青霉素类药物之间呈不完全的交叉过敏反应。虽然有些患者对青霉素类不过敏,但也存在着对头孢类药物过敏的可能性。因此,作为医、护、药工作人员在给患者使用此类药物之前,必须仔细询问患者的用药史及有无过敏史,一般情况下必须做皮试,并在使用过程中密切注意观察;如对此类药物有过敏史者应一律禁用。

收稿日期:2003-12-29