

康妇凝胶致用药部位疼痛 1 例

高俊玲, 刘丹, 刘文艳, 周晓丹, 樊彬, 边瑞民^{*}(滨州医学院附属医院, 山东 滨州 256603)

关键词: 康妇凝胶; 不良反应; 真菌性阴道炎; 细菌性阴道炎; 疼痛

中图分类号: R969.3 文献标志码: B 文章编号: 1007-7693(2020)09-1129-02

DOI: 10.13748/j.cnki.issn1007-7693.2020.09.019

引用本文: 高俊玲, 刘丹, 刘文艳, 等. 康妇凝胶致用药部位疼痛 1 例[J]. 中国现代应用药学, 2020, 37(9): 1129-1130.

1 病例资料

患者, 女, 32 岁, 2019 年 5 月 28 日因白带量大, 外阴瘙痒于滨州医学院附属医院妇科门诊就诊。妇科检查: 外阴肿胀湿润有刺痒感, 阴道充血, 有黄色分泌物, 呈豆腐渣样, 宫颈肥大, II 度糜烂。子宫前位, 正常大, 无压痛, 双侧附件正常。实验室检查: 荧光法检测加德纳菌阳性(+), 白带常规形态学检查结果, 清洁度 III 度, 白细胞(+), 乳酸杆菌(-), 杂菌(-), 上皮细胞(+), 白色念珠菌孢子检出, 白色念珠菌菌丝未见, 阴道毛滴虫未见, 线索细胞未见, 干化学检查结果, 过氧化氢阳性(+), 白细胞酯酶弱阳性(±), 唾液酸苷酶阴性, β-葡萄糖醛酸酶阴性, 乙酰氨基葡萄糖苷酶阴性, pH 值 5.4。HPV 检查、TCT 检查拒做。诊断: 真菌性, 细菌性阴道炎。无既往病史, 有青霉素过敏史, 无食物过敏史。予以氟康唑片 150 mg, 1 次单剂量口服, 抗真菌; 奥硝唑片 0.5 g 口服, 每天 2 次, 抗厌氧菌; 除湿止痒洗剂 15 mL 用水稀释 10 倍后洗浴, 每天 1 次; 康妇凝胶(贵州健兴药业有限公司, 国药准字 Z20050836, 批号: 20181005; 规格: 每支装 3 g) 1 支阴道给药, 每天 1 次。当日下午患者使用康妇凝胶后, 自觉疼痛难忍, 且疼痛逐渐加剧。患者随即自行清洗患处, 效果不佳, 约 3 h 后疼痛略减轻, 9 h 后疼痛感消失。5 月 29 日晚, 患者继续用该药, 仅在外阴处涂抹少量, 即出现疼痛, 遂自行停用康妇凝胶, 其余药物不变, 症状逐渐消失。6 月 4 日复诊遵医嘱将康妇凝胶改为双唑泰乳膏, 阴道给药每次 1 支, 每天 1 次, 其余药物不变, 随访 2 周, 患者诉无不适。

2 讨论

患者因真菌性阴道炎、细菌性阴道炎使用康妇凝胶, 符合药品说明书的适应证, 随后出现用药部位的剧烈疼痛, 康妇凝胶的使用与阴道疼痛时间相关性明确; 第 2 天, 患者使用康妇凝胶后再次出现剧烈疼痛, 其余药物不变, 停用该药后症状消失。根据诺氏药物不良反应评估量表, 药物不良反应评估为 7 分, 该患者用药部位疼痛是由康妇凝胶引起的可能性为很可能, 结果见表 1。

表 1 诺氏药物不良反应评估量表

Tab. 1 Naranjo's ADR evaluation scale

相关问题	得分情况			
	是	否	未知	评分理由
1. 该 ADR 先前是否有结论性报告		0		该 ADR 说明书中无记载, 中外文献未见报道, 故无结论性报告
2. 该 ADR 是否是在使用可疑药物后发生的	+2			该 ADR 是在使用康妇凝胶后发生
3. 该 ADR 是否在停药或应用拮抗剂后得到缓解	+1			该 ADR 在康妇凝胶停药后得到缓解
4. 该 ADR 是否在再次使用可疑药物后重复出现	+2			该 ADR 再次使用康妇凝胶后再次发生
5. 是否存在其他原因能单独引起该 ADR		+2		结合该患者病情及其余 3 种药物, 不存在能单独引起该 ADR 的原因
6. 该 ADR 是否是在应用安慰剂后重复出现			0	未应用安慰剂
7. 药物在血液或其他体液中是否达毒性浓度			0	未测浓度
8. 该 ADR 是否随剂量增加而加重, 或随剂量减少而缓解			0	未增加或减少剂量
9. 患者是否曾暴露于同种或同类药物并出现过类似反应		0		患者未曾先前暴露于同类或同种药物出现过类似反应
10. 是否存在任何客观证据证实该反应		0		未发现存在客观证据证实该反应
总得分				7 分

作者简介: 高俊玲, 女, 主管药师
E-mail: mk2006.ok@163.com

Tel: 13455765931

E-mail: byfyzykf@163.com

*通信作者: 边瑞民, 男, 主管药师

Tel: 13305437182

康妇凝胶成分为白芷、蛇床子、花椒、土木香、冰片，具有祛风燥湿、止痒杀虫、防腐生肌的作用，用于外阴炎，出血外阴溃疡，阴道炎等引起的外阴或阴道充血、肿胀、灼热、疼痛、分泌物增多或局部溃疡、糜烂、瘙痒等。查阅康妇凝胶说明书，不良反应尚不明确；以“康妇凝胶”“康妇凝胶+不良反应”为主题词，检索中国知网、万方医学数据库截至 2019 年 6 月收录的文献仅有 1 篇康妇凝胶不良反应的相关报道。报道称，根据临床观察，患者初次使用康妇凝胶时有灼热感，20 min 后自动消失，未特殊处理，无其他不良反应。

目前，康妇凝胶致用药部位疼痛为未见报道

的不良反应，其作用机制尚不明确。经查阅文献有报道称五倍子、蛇床子、生黄柏加冰片研粉置入阴道治疗滴虫性阴道炎，出现外阴奇痒、肿痛，因冰片对皮肤黏膜有局部刺激作用，可引起过敏反应，表现为全身出现荨麻疹、奇痒，以口唇、阴部为甚，考虑上述不良反应与冰片有关。本例患者使用康妇凝胶后出现不良反应，可能与冰片对皮肤黏膜局部有刺激作用有关，也可能与患者个人体质有相关性，有待进一步研究发现。本例提示，使用本药时，应注意观察用药后的反应，如若出现疼痛等不适症状，及时停药就医。

收稿日期：2019-09-04

(本文责编：沈倩)

中国现代应用药学
http://www.chinjmap.com